

グリストキラー

使用量の目安

汚れ具合やサイズにより異なりますが、初回はなるべく1kgご使用下さい。

2回目以降は隔週で500gずつのご使用を推奨しています。

グリストラップの内寸を測りタテ(cm)×ヨコ(cm)=10,000以内の場合、1kg使用しそれ以上の場合にはタテ(cm)×ヨコ(cm)×「0.1~0.3※」=使用量(g)

※汚れ具合に応じて調整してください

使用方法

1. 薬剤をお湯で溶かす：1kgの薬剤に対し10L程のお湯で溶かします。500gの場合は5L程のお湯で溶かします。
2. グリストラップに投入：グリストラップ全体に行きわたるよう投入し、かき混ぜる。
3. 発泡・油分分解：30分ほどで発泡が落ち着きます。(油分量により異なります)それまでグリストラップに水を流さないようにして下さい。流してしまうと、薬剤が排水溝へ流れ、効果が薄れます。
4. 普段通りご使用再開：発泡が落ち着いたなら、普段通りにご使用再開して下さい。泡を流しても問題ありません。
※発泡した泡がグリストラップから溢れる場合がありますが、洗浄成分でするので問題ありません。

注意事項

1. 火気、熱(機械室、ボイラー室、車内等)、直射日光を避け湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。
2. 他の塩素系薬剤、次亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸カルシウムとの直接混合使用は絶対にお避け下さい。
3. 目、鼻、口へ入らないようにして下さい。もし目に入った場合は擦らずに水で15分以上洗浄し、直ちに医師の手当てを受けて下さい。また、誤って飲み込んだ場合は直ちに医師の手当てを受けて下さい。
4. 火災時は現場から遠ざけて類焼を避けて下さい。消火の場合は大量の水をかけて下さい。
5. 子供の手の届かない所に保管して下さい。
6. 本製品は油分分解洗浄剤です。物理的なゴミ、汚泥等は分解できません。

株式会社ライズ

〒197-0003 東京都福生市熊川1712 笠原ビル201号

TEL : 042-539-2005 URL : <http://group-rise.com/>